

GASTROSKOPIA

Drogi pacjencie! Pamiętaj, że do gastrokopii musisz się odpowiednio przygotować. Również po przeprowadzeniu badania powinieneś się stosować do pewnych zaleceń.

Dowiedz się, jak postępować przed i po badaniu.

Gastroskopia w znieczuleniu miejscowym

Przygotowanie do badań

- 6-8 godzin przed badaniem nie możesz jeść ani pić, żuć gumy oraz palić papierosów
- jeśli przyjmujesz leki np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, przyjmij je we wczesnych godzinach porannych i popij niewielką ilością wody
- w dniu badania nie wolno Ci przyjmować leków przeciwcukrzycowych i na rozrzedzenie krwi
- jeśli przyjmujesz leki przeciwkrzepliwe, takie jak Xarelto, Pradaxa, Acenokumarol, Eliquis, Sintrom, Warfin – musisz je odstawić, zastąp te leki heparyną drobnocząsteczkową (w ramach POZ)
- prosimy Cię o przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej (np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów dotychczas wykonanych badań endoskopowych, EKG oraz aktualnych wyników badań laboratoryjnych)
- przygotuj listę przyjmowanych leków oraz ich dawki
- jeśli używasz okularów do czytania proszone, weź je ze sobą

Po badaniu:

- do 2 godzin po badaniu nie możesz jeść i pić, możesz jednak od razu wrócić do codziennych czynności

Te dokumenty weź ze sobą:

- skierowanie w wersji papierowej (jeśli badanie jest wykonywane w ramach NFZ)
- dowód osobisty
- ostatnie wyniki badań laboratoryjnych i dokumentacja medyczna Pacjenta

Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu, ponieważ czas trwania badań endoskopowych jest trudny do przewidzenia.

Zapisy:

Tel.: (22) 735 41 00

e-rejestracja dla pacjentów komercyjnych: https://ebok.emc-sa.pl/irs_client/termin/

W przypadku rezygnacji z badania/konsultacji/zabiegu, uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie recepcji szpitala pod numerem telefonu 22 735 41 00

Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym

Przygotowanie do badań

- 6-8 godzin przed badaniem nie możesz jeść ani pić, żuć gumy oraz palić papierosów
- jeśli przyjmujesz leki np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, przyjmij je we wczesnych godzinach porannych i popij niewielką ilością wody
- w dniu badania nie wolno Ci przyjmować leków przeciwcukrzycowych i na rozrzedzenie krwi
- jeśli przyjmujesz leki przeciwkrzepliwe, takie jak Xarelto, Pradaxa, Acenokumarol, Eliquis, Sintrom, Warfin – musisz je odstawić, zastąp te leki heparyną drobnocząsteczkową (w ramach POZ)
- prosimy Cię o przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej (np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów dotychczas wykonanych badań endoskopowych, EKG oraz aktualnych wyników badań laboratoryjnych)
- przygotuj listę przyjmowanych leków oraz ich dawki
- jeśli używasz okularów do czytania proszone, weź je ze sobą

Po badaniu

- będziesz przebywać pod obserwacją około 2 godziny i pod opieką osoby drugiej udasz się do domu (obowiązuje 24 godziny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych)
- około 2-3 godzin po badaniu możesz zacząć pić płyny, możesz również zjeść lekki posiłek

Te dokumenty musisz wziąć ze sobą

- skierowanie w wersji papierowej (jeśli badanie jest wykonywane w ramach NFZ)
- dowód osobisty
- ostatnie wyniki badań laboratoryjnych i dokumentacja medyczna Pacjenta
- wyniki badań:
 - morfologia
 - układ krzepnięcia (INR i APTT)
 - elektrolity
 - kreatynina
 - TSH (jeśli chorujesz na choroby tarczycy)

Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu, ponieważ czas trwania badań endoskopowych jest trudny do przewidzenia.

Zapisy:

Tel.: (22) 735 41 00

e-rejestracja dla pacjentów komercyjnych: https://ebok.emc-sa.pl/irs_client/termin/

W przypadku rezygnacji z badania/konsultacji/zabiegu, uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie recepcji szpitala pod numerem telefonu 22 735 41 00

KOLONOSKOPIA

Drogi pacjencie! Pamiętaj, że do kolonoskopii musisz się odpowiednio przygotować. Również po przeprowadzeniu badania powinieneś się stosować do pewnych zaleceń.

Dowiedz się, jak postępować przed i po badaniu.

Przygotowanie do badań

- kup jedno opakowanie preparatu przeczyszczającego typu Fortrans, Eziclen, Citrafleet, Moviprep. Lek przyjmij zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz w ulotce dołączonej do opakowania. Reakcją organizmu na przyjmowanie leku będą liczne wypróżnienia, na koniec treścią płynną (dobrze jest wówczas zostać w domu). Rekomendujemy zakup Fortrans, i Eziclen. Lek dostępny tylko na receptę. Po receptę należy udać się do lekarza rodzinnego.
- prosimy Cię o przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej (np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów dotychczas wykonanych badań endoskopowych, EKG oraz aktualnych wyników badań laboratoryjnych)
- jeśli przyjmujesz leki np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, przyjmij je we wczesnych godzinach porannych i popij niewielką ilością wody
- jeśli przyjmujesz leki przeciwkrzepliwe, takie jak Xarelto, Pradaxa, Acenokumarol, Eliquis, Sintrom, Warfin – musisz je odstawić, zastąp te leki heparyną drobnocząsteczkową (w ramach POZ)
- przygotuj listę przyjmowanych leków oraz ich dawki
- jeśli używasz okularów do czytania proszone, weź je ze sobą
- 5 dni przed badaniem stosuj dietę bezreszkową:
 - staraj się nie jeść surowych owoców i warzyw, zwłaszcza tych zawierających drobne pestki (winogron, malin, porzeczek, truskawek, kiwi, fig, pomidorów, ogórków)
 - unikaj jedzenia buraków, pieczywa z ziarnem i maku
 - możesz jeść mięso i ryby (zwłaszcza gotowane, duszone lub grillowane), makarony, białe pieczywo i ryż; możesz pić kawę, herbatę, soki klarowne, galaretki i kisiele (bez owoców) oraz klarowne buliony
- 2 dni przed badaniem stosuj dietę ubogo reszkową:
 - zrezygnuj z warzyw i owoców, tłustych potraw, kasz, soków i zup warzywnych, pełnoziarnistego pieczywa
 - w dniu poprzedzającym badanie dozwolone jest zjedzenie śniadania, bez surowych owoców i warzyw oraz napojów gazowanych
 - na śniadanie należy spożyć supkę krem z warzyw, kisiel lub białą bułkę bez ziaren z masłem i szynką. Inne napoje można spożywać w dowolnej ilości

Fortrans

Przygotowanie do badania dla Pacjentów z wyznaczonym terminem kolonoskopii w godzinach 8:00 - 12:00.

- w dniu poprzedzającym badanie, zgodnie z instrukcją, przygotuj 4 litry roztworu Fortrans (każdą saszetkę w 1 litrze niegazowanej wody). Roztwór wypij maksymalnie w przeciągu 3 - 4

godzin, pomiędzy godziną 17:00 a 21:00 (możesz poprawić smak roztworu, schładzając go lub dodając do niego sok z cytryny)

- w dniu poprzedzającym badanie dozwolone jest zjedzenie lekkiego śniadania, w formie płynu.
- w dniu zabiegu nie należy jeść ani pić (możesz ewentualnie popić poranne leki małą ilością wody niegazowanej)

Przygotowanie do badania dla Pacjentów z wyznaczonym terminem kolonoskopii w godzinach 12:00 - 18:00.

- w dniu poprzedzającym badanie, zgodnie z instrukcją, przygotuj 2 litry roztworu Fortrans (każdą saszetkę w 1 litrze niegazowanej wody). Roztwór wypij maksymalnie w przeciągu 2 - 3 godzin, pomiędzy godziną 19:00 a 21:00 (możesz poprawić smak roztworu, schładzając go lub dodając do niego sok z cytryny)
- od momentu, w którym zaczniesz pić preparat, nie możesz nic jeść (możesz jedynie napić się wody niegazowanej do 4 godzin przed zabiegiem)
- w dniu zabiegu nie należy jeść ani pić (możesz ewentualnie popić poranne leki małą ilością wody niegazowanej)
- pomiędzy godziną 5:00 - 6:00 przygotuj 2 litry roztworu Fortrans (każdą saszetkę w 1 litrze niegazowanej wody). Roztwór wypij pomiędzy godziną 5:00 - 7:00, nie później
- od momentu wypicia roztworu Fortrans możesz pić wodę niegazowaną, maksymalnie do 6 godzin przed zabiegiem

Eziclen

Przygotowanie do badania dla Pacjentów z wyznaczonym terminem kolonoskopii w godzinach 8:00 - 12:00.

- w dniu poprzedzającym badanie, nie później niż o 18:00 zgodnie z instrukcją, przygotuj preparat Eziclen (zawartość butelki leku wlej do załączonego kubka), dodaj wodę niegazowaną do leku do poziomu 0,5 l oznaczonego na kubku. Roztwór wypij maksymalnie w przeciągu 30 -60 min. (możesz poprawić smak roztworu, schładzając go lub dodając do niego sok z cytryny)
- w ciągu kolejnych 30 minut wypij 1 l wody niegazowanej lub innego niegazowanego napoju
- powtórz wszystkie powyższe czynności dla drugiej dawki leku po upływie 2 godzin od rozpoczęcia pierwszej
- od chwili, gdy zaczniesz pić preparat, nie możesz nic jeść (możesz jedynie napić się wody niegazowanej do 4 godzin przed zabiegiem)
- w dniu zabiegu nie należy nic jeść ani pić (możesz ewentualnie popić poranne leki małą ilością wody niegazowanej)

Przygotowanie do badania dla Pacjentów z wyznaczonym terminem kolonoskopii w godzinach 12:00 - 18:00.

- w dniu poprzedzającym badanie, nie później niż o 18:00 zgodnie z instrukcją, przygotuj preparat Eziclen (zawartość butelki leku wlej do załączonego kubka), dodaj wodę niegazowaną do leku do poziomu 0,5 l oznaczonego na kubku. Roztwór wypij maksymalnie w przeciągu 30 -60 min. (możesz poprawić smak roztworu, schładzając go lub dodając do niego sok z cytryny)
- od chwili, gdy zaczniesz pić preparat, nie możesz nic jeść (możesz jedynie napić się wody niegazowanej do 4 godzin przed zabiegiem)
- w dniu zabiegu nie należy nic jeść ani pić (możesz ewentualnie popić poranne leki małą ilością wody niegazowanej)
- we wczesnych godzinach porannych powtórz powyższe czynności dla drugiej dawki leku (po upływie ok. 10 - 12 godzin od wypicia pierwszej dawki roztworu). Roztwór należy wypić pomiędzy godziną 5:00- 7:00, nie później
- od momentu wypicia roztworu Eziclen dozwolone jest picie wody niegazowanej maksymalnie do 6 h przez zabiegiem

Jeśli będziesz mieć wykonywaną kolonoskopię w znieczuleniu ogólnym, te dokumenty musisz wziąć ze sobą:

- skierowanie na badanie (w ramach NFZ)
- wyniki badań:
 - morfologia
 - układ krzepnięcia (INR i APTT)
 - elektrolity
 - kreatynina
 - TSH (jeśli chorujesz na choroby tarczycy)

Po badaniu

- będziesz przebywać pod obserwacją około 2 godziny i pod opieką osoby drugiej udasz się do domu (obowiązuje 24 godziny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych)
- około 2-3 godzin po badaniu możesz zacząć pić płyny, możesz również zjeść lekki posiłek
- z uwagi na przebyte badanie i przygotowanie zalecamy stosowanie przez 2-3 dni po badaniu diety lekkostrawnej

Dokumenty wymagane do rejestracji:

- skierowanie w wersji papierowej (jeśli badanie jest wykonywane w ramach NFZ)
- dowód osobisty
- ostatnie wyniki badań laboratoryjnych i dokumentacja medyczna Pacjenta

Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu, ponieważ czas trwania badań endoskopowych jest trudny do przewidzenia.

Zapisy:

Tel.: (22) 735 41 00

e-rejestracja dla pacjentów komercyjnych: https://ebok.emc-sa.pl/irs_client/termin/

W przypadku rezygnacji z badania/konsultacji/zabiegu, uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie recepcji szpitala pod numerem telefonu 22 735 41 00